

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 27 марта 2024 г. N 143н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫХ
ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2
СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23
ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N 26-ФЗ "О ПРИРОДНЫХ
ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ,
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И
КУРОРТАХ", ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПЕРЕЧНЯ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ
РЕСУРСОВ**

В соответствии с пунктом 3 статьи 2.1, статьей 4 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", частью 5 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", подпунктами 5.2.35 и 5.2.196 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

классификацию природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристики согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

перечень медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и

медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2020 г., регистрационный N 60589);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 664н "О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2022 г., регистрационный N 71058);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2021 г., регистрационный N 65177);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 207н "О внесении изменений в классификацию природных лечебных ресурсов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2022 г., регистрационный N 68239);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. N 193н "О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" и в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2023 г., регистрационный N 73651).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Министр

М.А. МУРАШКО

Приложение N 1

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 27 марта 2024 г. N 143н

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N 26-ФЗ "О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ", ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I. Общие положения

1. Классификация природных лечебных ресурсов (далее - классификация) осуществляется по уникальности, категориям, подкатегориям, подклассам, группам, подгруппам, типам, подтипам, видам, подвидам и разновидностям природных лечебных ресурсов, используемых при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации.

2. Природные лечебные ресурсы, представленные на территории Российской Федерации, классифицируются как уникальные при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

представлены единственными в своем роде природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации;

не имеют аналогов по химическому составу и (или) агрегатному состоянию на территории Российской Федерации;

обладают исключительными лечебными свойствами, подтвержденными научными исследованиями, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.

II. Минеральные воды

3. Минеральные воды классифицируются по категориям, подкатегориям, группам, подгруппам.

4. В зависимости от целевого назначения минеральные воды классифицируются по категориям:

для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения;

питьевые.

5. В зависимости от совокупности показателей общей минерализации и содержания биологически активных компонентов в воде источника (скважины) минеральные воды, относящиеся к категории минеральных питьевых вод, классифицируются по подкатегориям:

лечебно-столовые (минерализация от 1 г/куб. дм, но не более 10 г/куб. дм или минерализация менее 1 г/куб. дм при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в абзацах восьмом - четырнадцатом пункта 6 классификации);

лечебные (минерализация от 10 г/куб. дм, но не более 15 г/куб. дм, или минерализация менее 10 г/куб. дм при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в абзацах двенадцатом - шестнадцатом пункта 6 классификации).

6. В зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости минеральные воды классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом воды в источнике (скважине) и значением минерализации (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения от 10,0 г/куб. дм и более, подготовленные для лечебных процедур, лечебно-столовые минеральные питьевые воды от 1,0 г/куб. дм, но не более 10,0 г/куб. дм, лечебные минеральные питьевые воды от 10,0 г/куб. дм, но не более 15,0 г/куб. дм);

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов в воде источника (скважины) (при соответствии массовой концентрации биологически активных компонентов показателям, приведенным в абзацах четвертом - шестнадцатом настоящего пункта, для конкретной категории и (или) подкатегории минеральных вод);

сероводородные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного сероводорода и гидросульфидного иона, массовая концентрация которых в воде источника (скважины) 10,0 мг/куб. дм и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

радоновые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием радона, массовая концентрация которого в воде источника (скважины) 5,0 нКи/куб. дм (185,0 Бк/куб. дм) и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

кремнистые термы (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) 50,0 мг/куб. дм и более, при температуре 35,0 градусов Цельсия и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

кислые рудничные (лечебно-профилактическое значение которых определяется низким (5,0 единиц и менее) значением реакции среды (рН) и содержанием, в том числе железа, алюминия, меди и других металлов в воде источника (скважины) (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

углекислые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного диоксида углерода (растворенного), массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 700,0 мг/куб. дм и более, а в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет 500,0 мг/куб. дм и более);

железистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием железа суммарного, массовая концентрация которого в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 10,0 мг/куб. дм и более);

слабокремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) составляет от 25,0 мг/куб. дм, но не более 50,0 мг/куб. дм в упакованных лечебно-столовых минеральных питьевых водах, не имеющих специальные медицинские показания к применению в лечебно-профилактических целях при отсутствии других классификационных показателей);

кремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 50,0 мг/куб. дм и более);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, составляет 5,0 мг/куб. дм и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от 5,0 мг/куб. дм, но не более 10,0 мг/куб. дм, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 10,0 мг/куб. дм);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 35 мг/куб. дм и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от 35,0 мг/куб. дм, но не более 100,0 мг/куб. дм, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 100,0 мг/куб. дм);

содержащие органические вещества (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием органических веществ, массовая концентрация которых в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) в расчете на углерод составляет от 5,0 мг/куб. дм, но не более 15,0 мг/куб. дм, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 15,0 мг/куб. дм);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в минеральной воде для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения и в лечебной минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 25,0 мг/куб. дм и более);

мышьяковистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием природного биологически активного мышьяка, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 0,7 мг/куб. дм упакованной лечебной минеральной питьевой воде составляет от 0,7 мг/куб. дм, но не более 5,0 мг/куб. дм, а в нативной (неупакованной) лечебной минеральной питьевой воде составляет от 0,7 мг/куб. дм, но не более 20,0 мг/куб. дм.

7. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов), значения минерализации, содержания спонтанных (растворенных) газов, мышьяка, железа, значения радиоактивности (радона), показателей реакции среды (далее - рН) и температуры воды в источнике (скважине), зависящих от реально существующих в природе естественных факторов их формирования (геохимических закономерностей, структурно-тектонической обстановки, литолого-фациального состава водовмещающих

пород), минеральные воды классифицируются по подгруппам, указанным в пунктах 8 - 16 настоящей классификации.

8. В зависимости от содержания ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов) воды в источнике (скважине) минеральные воды классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов) должно составлять не менее 20 процент-эквивалент (далее - %-экв.).

9. В зависимости от значения минерализации минеральные воды классифицируются по подгруппам:

пресные - не более 1,0 г/куб. дм;

слабоминерализованные - свыше 1,0 г/куб. дм, но не более 2,0 г/куб. дм;

маломинерализованные - свыше 2,0 г/куб. дм, но не более 5,0 г/куб. дм;

среднеминерализованные - свыше 5,0 г/куб. дм, но не более 10,0 г/куб. дм;

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/куб. дм, но не более 35,0 г/куб. дм;

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/куб. дм, но не более 150,0 г/куб. дм;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/куб. дм, но не более 350,0 г/куб. дм;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/куб. дм.

10. В зависимости от содержания свободного диоксида углерода (растворенного) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

слабоуглекислые - от 0,5 г/куб. дм, но не более 1,4 г/куб. дм;

углекислые средней концентрации - свыше 1,4 г/куб. дм, но не более 2,5 г/куб. дм;

сильноуглекислые - свыше 2,5 г/куб. дм.

11. В зависимости от содержания сероводорода общего ($H_2S + HS^-$) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

слабосероводородные - от 10 мг/куб. дм, но не более 50 мг/куб. дм;

сероводородные средней концентрации - свыше 50 мг/куб. дм, но не более 100 мг/куб. дм;

крепкие сероводородные - свыше 100 мг/куб. дм, но не более 250 мг/куб. дм;

очень крепкие сероводородные - свыше 250 мг/куб. дм, но не более 500 мг/куб. дм;

ультракрепкие сероводородные - свыше 500 мг/куб. дм.

В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) в скобках приводится дополнительная классификационная характеристика:

при рН менее 6,5 единиц - сероводородные;

при рН от 6,5 единиц, но не более 7,5 единиц - сероводородно-гидросульфидные;

при рН свыше 7,5 единиц - гидросульфидные.

12. В зависимости от содержания мышьяка в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

мышьяковистые (мышьяковые) - мышьяк в концентрации от 0,7 мг/куб. дм, но не более 5,0 мг/куб. дм;

крепкие мышьяковистые (крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации свыше 5,0 мг/куб. дм, но не более 10,0 мг/куб. дм;

очень крепкие мышьяковистые (очень крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации свыше 10,0 мг/куб. дм.

13. В зависимости от содержания железа в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

железистые - железо суммарное в концентрации от 10,0 мг/куб. дм, но не более 40,0 мг/куб. дм;

крепкие железистые - железо суммарное в концентрации свыше 40,0 мг/куб. дм, но не более 100,0 мг/куб. дм;

очень крепкие железистые - железо суммарное в концентрации свыше 100,0 мг/куб. дм.

14. В зависимости от значения радиоактивности (радона) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

очень слаборадоновые - от 5 нКи/куб. дм, но не более 20 нКи/куб. дм (от 185 Бк/куб. дм, но не более 740 Бк/куб. дм);

слаборадоновые - свыше 20 нКи/куб. дм, но не более 40 нКи/куб. дм (свыше 740 Бк/куб. дм, но не более 1480 Бк/куб. дм);

радоновые средней концентрации - свыше 40 нКи/куб. дм, но не более 200 нКи/куб. дм (свыше 1480 Бк/куб. дм, но не более 7400 Бк/куб. дм);

высокоррадоновые - свыше 200 нКи/куб. дм (свыше 7400 Бк/куб. дм).

15. В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

сильнокислые - менее 3,5 единиц;

кислые - от 3,5 единиц, но не более 5,5 единиц;

слабокислые - свыше 5,5 единиц, но не более 6,8 единиц;

нейтральные - свыше 6,8 единиц, но не более 7,2 единиц;

слабощелочные - свыше 7,2 единиц, но не более 8,5 единиц;

щелочные - свыше 8,5 единиц.

16. В зависимости от значения температуры в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

исключительно холодные (переохлажденные) - менее 0 градусов Цельсия;

очень холодные - от 0 градусов Цельсия, но не более 4 градусов Цельсия;

холодные - свыше 4 градусов Цельсия, но не более 20 градусов Цельсия;

теплые (слаботермальные) - свыше 20 градусов Цельсия, но не более 35 градусов Цельсия;

горячие (термальные) - свыше 35 градусов Цельсия, но не более 42 градусов Цельсия;

очень горячие (высокотермальные) - свыше 42 градусов Цельсия, но не более 100 градусов Цельсия;

исключительно горячие (перегретые) - свыше 100 градусов Цельсия.

III. Лечебные грязи

17. Лечебные грязи классифицируются по типам, подтипам, видам, подвидам, разновидностям.

18. В зависимости от происхождения лечебные грязи классифицируются по типам:

торфяные (болотные отложения торфов высокой степени разложения (процент от органического вещества 40% и более), преимущественно органического состава (содержание органических веществ - 50% и более от сухого вещества);

сапропелевые (иловые отложения преимущественно пресных водоемов, содержащие 10% и более в значительной степени разложившихся органических веществ растительного и животного происхождения (процент от сухого вещества);

иловые минеральные (сульфидные) (иловые отложения преимущественно соленых водоемов, содержащие менее 10% органических веществ (процент от сухого вещества), и обычно обогащенные водорастворимыми солями и сульфидами);

сопочные (глинистые образования, выбрасываемые по тектоническим трещинам газами и напорными водами, содержащие менее 5% органических веществ (процент от сухого вещества), различное количество водорастворимых солей, и иногда сульфиды).

19. В зависимости от значения минерализации грязевого раствора лечебные грязи классифицируются по подтипам:

пресноводные - менее 1 г/куб. дм;

низкоминерализованные - от 1 г/куб. дм, но не более 15 г/куб. дм;

среднеминерализованные - свыше 15 г/куб. дм, но не более 35 г/куб. дм;

высокоминерализованные - свыше 35 г/куб. дм, но не более 150 г/куб. дм;

соленасыщенные - свыше 150 г/куб. дм.

20. В зависимости от содержания сульфидов железа в естественной грязи лечебные грязи классифицируются по видам:

бессульфидные - менее 0,01%;

слабосульфидные - от 0,01%, но не более 0,15%;

среднесульфидные - свыше 0,15%, но не более 0,50%;

сильносульфидные - свыше 0,50%.

21. В зависимости от значения зольности (процент на сухое вещество) лечебные грязи, по типам лечебных грязей, классифицируются по подвидам:

торфяные: на низкозольные (менее 5%), среднезольные (от 5%, но не более 20%), высокозольные (свыше 20%);

сапропелевые: на низкозольные (менее 30%), среднезольные (от 30%, но не более 60%), высокозольные (свыше 60%, но не более 90%);

иловые минеральные (сульфидные): на высокозольные (90% и более);

сопочные: на высокозольные (95% и более).

22. В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) лечебные грязи классифицируются по разновидностям:

сильнокислые - менее 2,5 единиц;

кислые - от 2,5 единиц, но не более 5,0 единиц;

слабокислые - свыше 5,0 единиц, но не более 7,0 единиц;

слабощелочные - свыше 7,0 единиц, но не более 9,0 единиц;

щелочные - свыше 9,0 единиц.

IV. Рапа лиманов и озер

23. Рапа лиманов и озер классифицируется по группам, подгруппам.

24. Рапа лиманов и озер (природный насыщенный соляной раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения), в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируется по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации более 35 г/куб. дм);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/куб. дм);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 5 мг/куб. дм);

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/куб. дм брома и не менее 5 мг/куб. дм йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в рапе лиманов и озер составляет не менее 35 мг/куб. дм).

25. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам, указанным в пунктах 26 и 27 настоящей классификации.

26. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава классификация рапы лиманов и озер осуществляется по подгруппам начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

27. В зависимости от значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам:

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/куб. дм, но не более 150,0 г/куб. дм;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/куб. дм, но не более 350,0 г/куб. дм;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/куб. дм.

V. Бишофит

28. Бишофит классифицируется по группам, подгруппам.

29. Бишофит (насыщенный раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, по значению минерализации являющийся очень крепким (ультракрепким) рассолом (более 350,0 г/куб. дм), относящийся к подгруппе, соответствующей хлоридной магниевой подгруппе минеральных вод с содержанием хлоридов более 95%-экв., ионов магния более 90%-экв.) в зависимости от содержания биологически активных компонентов классифицируется по группам:

бромные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием брома, массовой концентрацией в бишофите от 2000 мг/куб. дм, но не более 8000 мг/куб. дм);

борные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием бора, массовой концентрацией (в пересчете на ортоборную кислоту) в бишофите от 500 мг/куб. дм, но не более 2000 мг/куб. дм).

30. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава бишофит классифицируется по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

VI. Лечебные соли

31. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по группам, подгруппам.

32. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, по целевому назначению относящиеся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации свыше 1 г/куб.

дм);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/куб. дм);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее 5 мг/куб. дм);

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/куб. дм брома и не менее 5 мг/куб. дм йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в растворе лечебных солей составляет не менее 35 мг/куб. дм);

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/куб. дм брома, не менее 5 мг/куб. дм йода и не менее 35 мг/куб. дм бора (в пересчете на ортоборную кислоту).

33. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации раствор лечебных солей классифицируется по подгруппам, указанным в пунктах 34 и 35 настоящей классификации.

34. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

35. В зависимости от значения минерализации раствор лечебных солей классифицируется по подгруппам:

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/куб. дм, но не более 35,0 г/куб. дм;

рассолы - свыше 35,0 г/куб. дм, но не более 150,0 г/куб. дм.

VII. Лечебные природные газы

36. Природные лечебные газы классифицируются по группам.

37. Лечебные природные газы, представляющие собой геотермальные газы, близкие по составу к атмосферному воздуху, обогащенному продуктами разложения органики, основным из которых является углекислый газ (90 - 100%) с температурой свыше 20 градусов Цельсия, но не более 105 градусов Цельсия, в зависимости от уровня относительной влажности классифицируются по группам:

влажные лечебные природные газы с относительной влажностью от 45%, но не более 100%;

сухие лечебные природные газы с относительной влажностью от 15%, но не более 45%.

VIII. Лечебный климат

38. Лечебный климат классифицируется по подклассам, группам.

39. В зависимости от многолетнего режима погоды лечебный климат классифицируется по подклассам:

приморский;

низкогорный - с высотой над уровнем моря от 500 м, но не более 1000 м;

среднегорный нижнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м;

среднегорный верхнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более 2000 м;

высокогорный - с высотой над уровнем моря свыше 2000 м;

равнинный лесной;

равнинный лесостепной;

равнинный полупустынный.

40. В зависимости от рельефа земной поверхности, наличия водных и растительных объектов лечебный климат классифицируется по группам:

1) приморский:

климат умеренно континентальный, с чертами морского влияния, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, жаркий и сухой, степной и полупустынной равнинной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, степной зоны;

климат морской, умеренных широт лесной зоны;

климат средиземноморский, сухих субтропиков;

климат средиземноморский, влажной субтропической зоны, предгорный;

климат средиземноморский, субтропической зоны, предгорный;

климат муссонный, умеренных широт; летом - с влажным морским воздухом лесной зоны, зимой - с континентальным, сухим воздухом лесной зоны;

2) низкогорный, с высотой над уровнем моря от 500, но не более 1000 м:

климат умеренно континентальный, низкогорных районов, лесной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, таежной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, степной зоны;

климат резко континентальный, таежной зоны;

3) среднегорный нижнего пояса, с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м, и среднегорный верхнего пояса, с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более

2000 м:

климат умеренно континентальный, среднегорный, степной зоны;

климат умеренно континентальный, среднегорный, лесной зоны;

климат резко континентальный, среднегорный, таежной зоны;

4) равнинный лесной:

климат переходный от морского к континентальному, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, близкий к морскому, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, лесной зоны;

континентальный климат степей, таежной зоны;

климат резко континентальный, лесной зоны;

5) равнинный лесостепной:

климат умеренно континентальный, лесостепной зоны;

климат умеренно континентальный;

климат умеренно континентальный, предгорный;

б) равнинный полупустынный:

климат умеренно континентальный, жаркий и сухой.

Приложение N 2

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 27 марта 2024 г. N 143н

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ
РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 2.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N
26-ФЗ "О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ,
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И
КУРОРТАХ"**

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации взрослого населения с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

| N п/п | Код по МКБ-10 <1> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Природные лечебные ресурсы |
|---|----------------------------|---|--|----------------------------|
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10) | | | | |
| 1. | A15 A17+ A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Лечебный климат |
| 2. | A16 | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний | Лечебный климат |
| 3. | Z20 | Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями | Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу | Лечебный климат |
| 4. | A18 | Туберкулез других органов | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза | Лечебный климат |
| 5. | B90 | Последствия туберкулеза | Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии | Лечебный климат |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|--|
| | | | сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10) | | | | |
| 6. | D50 | Железодефицитная анемия | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная). | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| | D51.8 | Другие витамин-В12-дефицитные анемии | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная). | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| | D52.0 | Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная). | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| | D52.8 | Другие фолиеводефицитные анемии | | |
| | D52.9 | Фолиеводефицитная анемия неуточненная | | |
| | D55 | Анемия вследствие ферментных нарушений | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Лечебный климат |
| | D60 - D64 | Апластические и другие анемии | | |
| 7. | D69.4 | Другие первичные тромбоцитопении | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Лечебный климат |
| | D69.9 | Геморрагическое состояние неуточненное | | |
| 8. | D80 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Лечебный климат |
| | D81 | Комбинированные иммунодефициты | | |
| 9. | D86.0 | Саркоидоз легких | Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени | Лечебный климат |
| | D86.2 | Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов | | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10) | | | | |
| 10. | E01.0 | Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| | E01.8 | Другие болезни | | |

| | | | | |
|-----|----------------|---|--|---|
| | | щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния | | |
| 11. | E02 | Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности | Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 12. | E04.0 | Нетоксический диффузный зоб | Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат Лечебный климат |
| | E04.1 | Нетоксический одноузловой зоб | | |
| | E04.2 | Нетоксический многоузловой зоб | | |
| 13. | E05 | Тиреотоксикоз [гипертиреоз] | При увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| | E05.0 | Тиреотоксикоз с диффузным зобом | | |
| 14. | E06.3 E06.5 | Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит | Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 15. | E07.1 E07.8 | Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы | Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---|---|
| 16. | E10 | Сахарный диабет 1 типа | Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 17. | E11 | Сахарный диабет 2 типа | При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 18. | E23.2 | Несахарный диабет | Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 19. | E28.0 E28.3 | Избыток эстрогенов Первичная яичниковая недостаточность | В фазе компенсации, субкомпенсации | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 20. | E66.0 E66.1 E66.2 E66.8 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией Другие формы ожирения | Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 21. | E68 | Последствия избыточности питания | Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени, при отсутствии | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика | |
| 22. | E74 E74.8 | Другие нарушения обмена углеводов Другие уточненные нарушения обмена углеводов | Нарушение толерантности к глюкозе Нарушение гликемии натощак | Минеральные воды (питьевые) |
| 23. | E78 E78.4 | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии Другие гиперлипидемии | Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 24. | E79 E79.0 E79.8 | Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов | В фазе обострения и ремиссии | Минеральные воды (питьевые) |
| 25. | E83 E83.8 | Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена | В фазе компенсации и декомпенсации | Минеральные воды (питьевые) |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10) | | | | |
| 26. | F43.1 F45.3 F48 | Посттравматическое стрессовое расстройство Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы Другие невротические расстройства | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 27. | F50 - F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10) | | | | |
| 28. | G09 | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы | Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, | Лечебный климат |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---|---|
| | | | <p>через 3 месяца от даты начала заболевания.</p> <p>Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности.</p> <p>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6 - 8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности</p> | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p> |
| 29. | G20 | Болезнь Паркинсона | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат</p> |
| 30. | G21.1 G21.2 G21.3 G21.8 | <p>Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами</p> <p>Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами</p> <p>Постэнцефалитический паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма</p> | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат</p> |
| 31. | G22 | Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках | Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат</p> |
| 32. | G24.0 G24.3 G24.4 G24.5 | <p>Дистония, вызванная лекарственными средствами</p> <p>Спастическая кривошея</p> <p>Идиопатическая рото-лицевая дистония</p> <p>Блефароспазм</p> | I - II степень тяжести, без болевого синдрома | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | G24.8 | Прочие дистонии | Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения | |
| 33. | G25 G25.0 G25.1 G25.2 G25.4 G25.5 G25.8 | Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения Эссенциальный тремор Тремор, вызванный лекарственным средством Другие уточненные формы тремора Хорея, вызванная лекарственным средством Другие виды хорей Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения | Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, |
| 34. | G35 | Рассеянный склероз | Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов | Лечебный климат |
| 35. | G43.0 G43.1 G43.3 | Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень | Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 36. | G44.0 G44.2 G44.3 G44.4 | Синдром "гистаминовой" головной боли Головная боль напряженного типа Хроническая посттравматическая головная боль Головная боль, вызванная применением | Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | | лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках | | |
| 37. | G47.0 G47.1 G47.2 | Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница] Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния] Нарушения цикличности сна и бодрствования | Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 38. | G50.0 G50.1 G50.8 | Невралгия тройничного нерва Атипичная лицевая боль Другие поражения тройничного нерва | Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 39. | G51.0 G51.1 G51.2 G51.3 G51.4 G51.8 | Паралич Белла Воспаление узла колена лицевого нерва Синдром Россолимо-Мелькерссона Клонический гемифациальный спазм Лицевая миокимия Другие поражения лицевого нерва | Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 40. | G54.0 G54.1 G54.2 G54.3 G54.4 G54.5 G54.6 | Поражения плечевого сплетения Поражения пояснично-крестцового сплетения Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках Невралгическая амиотрофия Синдром фантома конечности с болью | Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| | G54.7 | Синдром фантома конечности без боли | | |
| 41. | G55.1 G55.2 G55.3 G55.8 | Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках | Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 42. | G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 | Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва | Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 43. | G57.0 G57.1 G57.2 G57.3 G57.4 G57.5 G57.6 | Поражение седалищного нерва Мералгия парестетическая Поражение бедренного нерва Поражение бокового подколенного нерва Поражение срединного подколенного нерва Синдром предплюсневого канала Поражение подошвенного нерва | Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 44. | G58.0 G58.7 G58.8 | Межреберная невропатия Множественный мононеврит Другие уточненные виды мононевропатии | Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 45. | G60.0 G60.1 | Наследственная моторная и сенсорная невропатия Болезнь Рефсума | Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|---|
| | G60.2 | Невропатия в сочетании с наследственной атаксией | явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов | применения), лечебные грязи |
| 46. | G62.0 G62.1 G62.2 G62.8 | Лекарственная полиневропатия Алкогольная полиневропатия Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами Другие уточненные полиневропатии | Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов. Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов. Полиневропатии с сенсорными и вегетосенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 47. | G71.0 G71.1 G71.2 | Мышечная дистрофия Миотонические расстройства Врожденные миопатии | Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 48. | G80 | Детский церебральный паралич | Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 49. | G90.0 G90.1 G90.2 G90.3 | Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Семейная дизавтономия [Райли-Дея] Синдром Горнера Полисистемная | Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---|--|
| | | дегенерация | ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии. Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | |
| | G90.8 | Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | | |
| 50. | G95.1 | Сосудистые миелопатии | Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции газовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10) | | | | |
| 51. | H01.0 H01.1 | Блефарит Неинфекционные дерматозы века | Хронический блефарит вне фазы обострения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 52. | H04.0 H04.4 H04.8 | Дакриоаденит Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата | Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии, хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 53. | H10.4 | Хронический конъюнктивит | Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 54. | H15.0 H15.1 | Склерит Эписклерит | Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 55. | H16.2 | Кератоконъюнктивит | Хронический кератоконъюнктивит вне обострения | Лечебный климат |
| 56. | H20.1 | Хронический иридоциклит | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 57. | H22.1 | Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках | Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---|--|
| | | | анкилозирующем спондилоартрите не ранее чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания | климат |
| 58. | H40.1 H40.2 | Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома | Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления | Лечебный климат |
| 59. | H52.1 | Миопия | Миопия высокой степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 60. | H47.2 | Атрофия зрительного нерва | Частичная атрофия зрительного нерва | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 61. | H35.5 H36.0 | Наследственные ретинальные дистрофии Диабетическая ретинопатия | Ретиная (альбипунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10) | | | | |
| 62. | H65.2 H65.3 H65.4 | Хронический серозный средний отит Хронический слизистый средний отит Другие хронические негнойные средние отиты | Хронический средний отит вне фазы обострения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 63. | H73.1 | Хронический мирингит | Хронический мирингит в фазе ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 64. | H80 | Отосклероз | Фаза ремиссии | Лечебный климат |
| 65. | H90.3 H90.4 | Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на | Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота. Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |

| | | | | |
|--|----------------|--|---|-----------------|
| | | противоположном ухе | приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота. Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота | |
| 66. | H93.0 H93.1 | Дегенеративные и сосудистые болезни уха Шум в ушах (субъективный) | Фаза ремиссии | Лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10) | | | | |
| 67. | I05.0 I05.1 | Митральный стеноз Ревматическая недостаточность митрального клапана | Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК <2> I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса), без признаков активности процесса | Лечебный климат |
| | I05.2 | Митральный стеноз с недостаточностью | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса. | Лечебный климат |
| | I05.8 | Другие болезни митрального клапана | Ревматический митральный порок: | Лечебный климат |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| | | | <p>митральная недостаточность, ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии</p> | <p>Лечебный климат</p> <p>Лечебный климат</p> |
| 68. | <p>I06.1</p> <p>I06.2</p> <p>I06.8</p> | <p>Ревматическая недостаточность аортального клапана</p> <p>Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие ревматические болезни аортального клапана</p> | <p>Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии</p> | Лечебный климат |
| 69. | <p>I07</p> <p>I07.1</p> <p>I07.2</p> <p>I07.8</p> | <p>Ревматические болезни трехстворчатого клапана</p> <p>Трикуспидальная недостаточность</p> <p>Трикуспидальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни трехстворчатого клапана</p> | <p>Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> | Лечебный климат |
| 70. | I08 | Поражения нескольких клапанов | Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и | Лечебный климат |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---|
| | I08.0 | Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов | проводимости, без признаков активности процесса. Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | |
| 71. | I10 | Эссенциальная [первичная] гипертензия | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II). Ожирение I - III степени. Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II). Ожирение I - III степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат Лечебный климат |
| 72. | I11.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| | I11.9 | Гипертензивная | Артериальная гипертензия, | Минеральные воды |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|---|
| | | [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIa стадии (ФК II). Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II) | (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат Лечебный климат Лечебный климат |
| 73. | I15.0 I15.1 I15.2 | Реноваскулярная гипертензия Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям | Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIa стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное | Лечебный климат |

| | | | | |
|-----|----------------|---|---|---|
| | | | самообслуживание. Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения только при ХСН не выше I стадии), лечебный климат (кроме высокогорного, среднегорного, низкогорного) |
| 74. | I20 | Стенокардия [грудная жаба] | Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат (кроме высокогорного) |
| | I20.1 | Стенокардия с документально подтвержденным спазмом | Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II). Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II) Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II) | Лечебный климат Лечебный климат (равнинный лесной, равнинный лесостепной) |
| 75. | I25.1 I25.2 | Атеросклеротическая болезнь сердца Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда | Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

| | | | | |
|-----|----------------|---|---|---|
| | I25.3 | Аневризма сердца | стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | Лечебный климат |
| 76. | I34.1 | Пролапс [пролабирование] митрального клапана | Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 77. | I41.0 I41.1 | Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках | Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше ПА стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше ПА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | Лечебный климат Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 78. | I42 I43 | Кардиомиопатия Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в | Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| | | других рубриках | или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | климат Лечебный климат |
| 79. | I67.2 I67.4 I67.8 | Церебральный атеросклероз Гипертензивная энцефалопатия Другие уточненные поражения сосудов мозга | 1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 80. | I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4 | Последствия субарахноидального кровоизлияния Последствия внутричерепного кровоизлияния Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния Последствия инфаркта мозга Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга | Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания | Лечебный климат |
| 81. | I70.0 I70.1 I70.2 I70.8 | Атеросклероз аорты Атеросклероз почечной артерии Атеросклероз артерий конечностей Атеросклероз других артерий | Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшного аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|--|
| | | | 6 месяцев после операции). Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 82. | I73.0 | Синдром Рейно | Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 83. | I83.9 | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления | Хроническая венозная недостаточность | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 84. | I87.0 I87.2 | Посттромботический синдром Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) | Хроническая венозная недостаточность (II - IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 85. | I89 | Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов | Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфорей, трофических язвенных поражений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 86. | I95.0 I95.1 I95.2 | Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия Гипотензия, вызванная лекарственными средствами | Эссенциальная гипотензия | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 87. | I97 | Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений | Лечебный климат |

| | | | | |
|--|-------|--|---|---|
| | I97.1 | Другие функциональные нарушения после операций на сердце | <p>сердечного ритма и проводимости ХСН I стадии. В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма и проводимости.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени.</p> <p>Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости.</p> | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат</p> <p>Лечебный климат (кроме высокогорного, среднегорного, низкогорного)</p> <p>Лечебный климат</p> <p>Минеральные воды, лечебный климат</p> <p>Минеральные воды, лечебный климат</p> <p>Лечебный климат</p> |
| | I97.2 | Синдром постмастэктомического | Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без | Лечебный климат (в нежаркое время года) |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | лимфатического отека | лимфореи, трофических язвенных поражений | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10) | | | | |
| 88. | J12.0 J12.1 J12.2 | Аденовирусная пневмония Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Лечебный климат, лечебные грязи |
| 89. | J13 | Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Лечебный климат, лечебные грязи |
| 90. | J14 | Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Лечебный климат, лечебные грязи |
| 91. | J15.0 J15.2 J15.3 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8 | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> Пневмония, вызванная стафилококком Пневмония, вызванная стрептококком группы В Пневмония, вызванная другими стрептококками Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i> Пневмония, вызванная другими грамотрицательными бактериями Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Другие бактериальные пневмонии | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Лечебный климат, лечебные грязи |
| 92. | J16.0 | Пневмония, вызванная хламидиями | Затяжная пневмония с установленными клинически и | Лечебный климат, лечебные грязи |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|---|
| | J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами | рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | |
| 93. | J18 | Пневмония без уточнения возбудителя | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Лечебный климат, лечебные грязи |
| 94. | J41.0 J41.1 J41.8 | Простой хронический бронхит Слизисто-гнойный хронический бронхит Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Лечебный климат, минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 95. | J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 96. | J45.0 J45.1 J45.8 | Астма, с преобладанием аллергического компонента Неаллергическая астма Смешанная астма | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени. Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат Лечебный климат |
| 97. | J47 | Бронхоэктатическая болезнь | Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Лечебный климат |
| 98. | J60 | Пневмокониоз угольщика | Пневмокониозы в фазе полной | Минеральные воды (для |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|--|
| | J61 | Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами | ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| | J62 | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний | | |
| | J63 | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью | | |
| | J64 | Пневмокониоз неуточненный | | |
| | J65 | Пневмокониоз, связанный с туберкулезом | | |
| | J66.0 | Биссиноз | | |
| | J66.1 | Болезнь трепальщиков льна | | |
| | J66.8 | Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью | | |
| 99. | J67.0 | Легкое фермера [сельскохозяйственного работника] | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| | J67.2 | Легкое птицевода | | |
| | J67.4 | Легкое работающего с солодом | | |
| | J67.5 | Легкое работающего с грибами | | |
| | J67.8 | Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью | | |
| | J68.0 | Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами | | |
| | J68.4 | Химические | При наличии дыхательной | |

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | J68.8 | респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами | недостаточности не выше II степени. Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10) | | | | |
| 100. | K20 | Эзофагит | I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 101. | K21.0 K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии. Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 102. | K22.0 K22.4 | Ахалазия кардиальной части Дискинезия пищевода | Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 103. | K25.7 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения | Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 104. | K26.7 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения | Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 105. | K28 | Гастроеюнальная язва | Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 106. | K29.3 | Хронический поверхностный гастрит | Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |

| | | | | |
|------|-------------------------|--|---|---|
| | K29.4 K29.8 | Хронический атрофический гастрит Дуоденит | Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии | |
| 107. | K52.8 | Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты | Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 108. | K58 K58.9 | Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи | Синдром раздраженного кишечника без диареи Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 109. | K59 K59.0 | Другие функциональные кишечные нарушения Запор | Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 110. | K66.0 K66.8 | Брюшинные спайки Другие уточненные поражения брюшины | Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 111. | K71.3 | Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита | Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 112. | K73.0 K73.1 | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 113. | K74.0 K74.1 K74.3 | Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности | Лечебный климат |
| 114. | K80.2 | Камни желчного пузыря | Желчнокаменная болезнь без | Минеральные воды |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| | | без холецистита | приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии | (питьевые) |
| 115. | K81.1 | Хронический холецистит | Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 116. | K83.0 | Холангит | Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 117. | K86.1 | Другие хронические панкреатиты | Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома | Минеральные воды (питьевые) |
| 118. | K91.1 K91.2 K91.4 K91.5 | Синдром оперированного желудка Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Дисфункция после колостомии и энтеростомии Постхолецистэктомический синдром | Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культуры, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки и врожденными аномалиями (классы XII и XVII по МКБ-10) | | | | |
| 119. | L20.8 | Другие атопические дерматиты | Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического |

| | | | | |
|------|--------------------------|---|--|--|
| | | | выраженной аллергией. Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии | применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 120. | L23 L24 L25 L27 | Аллергический контактный дерматит Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит Контактный дерматит неуточненный Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь | В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 121. | L28.0 L28.2 | Простой хронический лишай Другая почесуха | Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии. Почесуха легкой степени выраженности | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 122. | L29.8 | Другой зуд | Зуд кожи, хроническое течение | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 123. | L40.0 L40.5+ | Псориаз обыкновенный Псориаз артропатический | Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии. Псориаз с артралгиями | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 124. | L43.0 L43.8 | Лишай гипертрофический красный плоский Другой красный плоский лишай | Хроническое течение, ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 125. | L70.0 L70.8 | Угри обыкновенные [acne vulgaris] Другие угри | Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 126. | L85.2 | Кератоз точечный (ладонно-подошвенный) | Кератоз точечный, хроническое течение | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 127. | L90.5 | Рубцовые состояния и фиброз кожи | Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие | Минеральные воды (для наружного |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | L91 | Гипертрофические изменения кожи | гипертрофические изменения кожи | бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 128. | L94.0 L94.1 L94.3 | Локализованная склеродермия [morphea] Линейная склеродермия Склеродактилия | Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 129. | L97 | Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках | Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 130. | Q80.0 Q80.1 Q80.2 Q80.3 Q80.8 | Ихтиоз простой Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз) Пластинчатый [ламеллярный] ихтиоз Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия Другой врожденный ихтиоз | Наследственный ихтиоз при отсутствии пузырей, эрозии, вторичного инфицирования | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат (в теплое время года), лечебные грязи |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10) | | | | |
| 131. | M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8 | Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии | Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше 1 степени, при отсутствии инфекции | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 132. | M05 M05.8 | Серопозитивный ревматоидный артрит Другие серопозитивные ревматоидные артриты | Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 133. | M06.0 | Серонегативный ревматоидный артрит | Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные |

| | | | | |
|------|---|--|---|---|
| | | | прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | грязи, лечебные природные газы |
| 134. | M07.0 M07.2 M07.3 M07.5 M07.6 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии Артропатия при язвенном колите Другие энтеропатические артропатии | Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 135. | M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит | Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 136. | M10.0 | Идиопатическая подагра | Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 137. | M15.0 M15.1 M15.2 M15.3 M15.4 | Первичный генерализованный (остео)артроз Узлы Гебердена (с артропатией) Узлы Бушара (с артропатией) Вторичный множественный артроз Эрозивный (остео)артроз | Полиоостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|------|-------|--|---|--|
| | | | артрогенными контрактурами | |
| 138. | M16.0 | Первичный коксартроз двусторонний | Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | M16.1 | Другой первичный коксартроз | | |
| | M16.2 | Коксартроз в результате дисплазии двусторонний | | |
| | M16.3 | Другие диспластические коксартрозы | | |
| | M16.4 | Посттравматический коксартроз двусторонний | | |
| | M16.5 | Другие посттравматические коксартрозы | | |
| | M16.6 | Другие вторичные коксартрозы двусторонние | | |
| 139. | M17.0 | Первичный гонартроз двусторонний | Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | M17.1 | Другой первичный гонартроз | | |
| | M17.2 | Посттравматический гонартроз двусторонний | | |
| | M17.3 | Другие посттравматические гонартрозы | | |
| | M17.4 | Другие вторичные гонартрозы двусторонние | | |
| 140. | M19.0 | Первичный артроз других суставов | Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | M19.1 | Посттравматический артроз других суставов | | |
| | M19.2 | Вторичный артроз других суставов | | |
| | M19.8 | Другой уточненный артроз | | |
| 141. | M41.0 | Инфантильный идиопатический сколиоз | Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
| | M41.1 | Юношеский идиопатический сколиоз | | |
| | M41.2 | Другие идиопатические сколиозы | | |
| | M41.3 | Торакогенный сколиоз | | |
| | M41.4 | Нервно-мышечный сколиоз | | |
| | M41.5 | Прочие вторичные | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------|---|---|--|
| | M41.8 | сколиозы Другие формы сколиоза | | |
| 142. | M42.0 M42.1 | Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз позвоночника у взрослых | Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 143. | M45 | Анкилозирующий спондилит | Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3 - 2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 144. | M54 | Дорсалгия | Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 145. | M60.1 M60.8 | Интерстициальный миозит Другие миозиты | Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 146. | M65.2 M65.3 M65.4 M65.8 | Кальцифицирующий тендинит Щелкающий палец Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] Другие синовиты и теносиновиты | Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 147. | M70 | Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением | Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 148. | M70.2 M70.4 | Бурсит локтевого отростка Препателлярный бурсит | Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и | Минеральные воды (для наружного |

| | | | | |
|------|---|---|--|---|
| | | | (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита | бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 149. | M72.0 M72.1 M72.2 M72.5 M72.8 | Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев Подошвенный фасциальный фиброматоз Фасциит, не классифицированный в других рубриках Другие фибробластические нарушения | Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые. Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 150. | M75.0 M75.1 M75.2 M75.3 M75.4 M75.5 M75.8 | Адгезивный капсулит плеча Синдром сдавления ротатора плеча Тендинит двуглавой мышцы Кальцифицирующий тендинит плеча Синдром удара плеча Бурсит плеча Другие поражения плеча | Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 151. | M76.0 M76.1 M76.2 M76.3 M76.4 M76.5 | Тендинит ягодичных мышц Тендинит поясничных мышц Шпора подвздошного гребешка Подвздошный большеберцовый связочный синдром Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды] Тендинит области надколенника | Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|------|---|--|--|---|
| | M76.6 | Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия | | |
| | M76.7 | Тендинит малоберцовой кости | | |
| | M76.8 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу | | |
| 152. | M77.0 M77.1 M77.2 M77.3 M77.4 M77.5 M77.8 | Медиальный эпикондилит Латеральный эпикондилит Периартериит запястья Пяточная шпора Метатарзалгия Другие энтезопатии стопы Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках | Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 153. | M81.0 M81.1 M81.3 M81.4 M81.5 M81.6 M81.8 | Постменопаузный остеопороз Остеопороз после удаления яичников Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания Лекарственный остеопороз Идиопатический остеопороз Локализованный остеопороз [Лекена] Другие остеопорозы | Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 154. | M84.0 M84.1 M84.2 M84.3 M84.4 M84.8 M85.1 | Плохое сращение перелома Несращение перелома [псевдоартроз] Замедленное сращение перелома Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках Другие нарушения целостности кости Флюороз скелета | Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 155. | M86.3 | Хронический многоочаговый | Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции | Минеральные воды (для наружного |

| | | | |
|--|--|--|---|
| M86.4 | остеомиелит Хронический остеомиелит с дренированным синусом | движения 1 - 2 степени. Хронический остеомиелит в фазе ремиссии | бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты | | |
| M86.6 | Другой хронический остеомиелит | | |
| M86.8 | Другой остеомиелит | | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10) | | | |
| 156.N03 | Хронический нефритический синдром | Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии | Лечебный климат |
| 157.N04 | Нефротический синдром | Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопротеинемии | Лечебный климат |
| 158.N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом | Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| N11.8 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | | |
| 159.N20.0 | Камни почки | Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомофункциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе | Минеральные воды (питьевые) |
| N20.1 | Камни мочеточника | | |
| N20.2 | Камни почек с камнями мочеточника | | |

| | | | | |
|------|-------------------------|--|---|---|
| | | | ремиссии | |
| 160. | N21.0 N21.8 | Камни в мочевом пузыре Другие камни в нижних отделах мочевых путей | Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии | Минеральные воды (питьевые) |
| 161. | N30.1 N30.2 N30.3 | Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит | Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 162. | N41.1 N41.3 | Хронический простатит Простатоцистит | Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 163. | N45.9 | Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе | Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 164. | N70 N70.1 | Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит | Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников; при наличии гипозестрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|------|-----------------------|--|---|--|
| | | | (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей) | |
| 165. | N71.1 | Хроническая воспалительная болезнь матки | Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников; при наличии гипозестрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 166. | N73 N73.1 N73.6 | Другие воспалительные болезни женских тазовых органов Хронический параметрит и тазовый целлюлит Тазовые перитонеальные спайки у женщин | Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника; при наличии гипозестрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |

| | | | | |
|------|---|--|--|---|
| | | | <p>периода и нормализации клинических показателей). Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника</p> | |
| 167. | N80.0 N80.1 N80.2 N80.3 N80.4 | <p>Эндометриоз матки Эндометриоз яичников Эндометриоз маточных труб Эндометриоз тазовой брюшины Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища</p> | <p>Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)</p> | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)</p> |
| 168. | N85.4 | <p>Неправильное положение матки</p> | <p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: при неизменной функции яичника; при наличии гипоэстрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного</p> | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | периода и нормализации клинических показателей) | |
| 169. | N95.1 N95.3 | Менопаузные и климактерические состояния у женщин Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой | Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 170. | N97.1 | Женское бесплодие трубного происхождения | Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза. Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита: при неизменной функции яичников; при наличии гиперэстрогении; при наличии гиперэстрогении | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10) | | | | |
| 171. | T52 T52.0 T52.1 T52.2 | Токсическое действие органических растворителей Токсическое действие нефтепродуктов Токсическое действие бензола Токсическое действие гомологов бензола | Токсическое поражение системы крови и нервной системы | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|------|-------|---|--|--|
| | T52.3 | Токсическое действие гликолей | | |
| | T52.4 | Токсическое действие кетонов | | |
| | T52.8 | Токсическое действие других органических растворителей | | |
| | T52.9 | Токсическое действие органических растворителей неуточненных | | |
| 172. | T53 | Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | T53.0 | Токсическое действие четыреххлористого углерода | | |
| | T53.1 | Токсическое действие хлороформа | | |
| | T53.2 | Токсическое действие трихлорэтилена | | |
| | T53.3 | Токсическое действие тетрахлорэтилена | | |
| | T53.4 | Токсическое действие дихлорметана | | |
| 173. | T56 | Токсическое действие металлов | Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | T56.0 | Токсическое действие свинца и его соединений | | |
| | T56.1 | Токсическое действие ртути и ее соединений | | |
| | T56.7 | Токсическое действие бериллия и его соединений | | |
| | T56.8 | Токсическое действие других металлов | | |
| 174. | T57 | Токсическое действие других неорганических веществ | Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | T57.0 | Токсическое действие мышьяка и его соединений | | |
| | T57.1 | Токсическое действие фосфора и его соединений | | |
| | T57.2 | Токсическое действие марганца и его соединений | | |
| 175. | T58 | Токсическое действие окиси углерода | | |

| | | | | |
|------|-------------------------|--|--|--|
| 176. | T59 | Токсическое действие других газов, дымов и паров | | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 177. | T60 T65 | Токсическое действие пестицидов Токсическое действие других и неуточненных веществ | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 178. | T66 | Неуточненные эффекты излучения | Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 179. | T69.8 | Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры | Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 180. | T70.0 T70.1 | Баротравма уха Баротравма придаточной пазухи | Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 181. | T75.2 T75.4 T75.8 | Воздействие вибрации Воздействие электрического тока Другие уточненные эффекты воздействия | Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени. В фазе компенсации функций пораженных органов. Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат Минеральные воды (для наружного |

| | | | | |
|------|-----|--------------------------------------|--|--|
| | | внешних причин | и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов. Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2, при ХСН I стадии (ФК I - II) | бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 182. | T90 | Последствия травм головы | Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 183. | T91 | Последствия травм шеи и туловища | Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 184. | T92 | Последствия травм верхней конечности | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные |

| | | | | |
|--|-------|---|---|---|
| | | | оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы | грязи |
| 185. | T93 | Последствия травм нижней конечности | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 186. | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (класс XXI по МКБ-10) | | | | |
| 187. | Z57.0 | Неблагоприятное воздействие производственного шума | Без признаков воздействия шума на орган слуха. | Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат |
| | Z57.1 | Неблагоприятное воздействие производственной радиации | Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений. | |
| | Z57.2 | Неблагоприятное воздействие производственной пыли | Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности. | |
| | Z57.3 | Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха | Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности. | |
| | Z57.4 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений. | |
| | Z57.5 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений. | |
| | Z57.6 | Неблагоприятное воздействие | Последствия профессионального острого | |

| | | | | |
|------|-------|--|---|-----------------|
| | Z57.7 | производственных экстремальных температур Неблагоприятное воздействие производственной вибрации | теплового воздействия и отморожений. Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений. | |
| | Z57.8 | Неблагоприятное воздействие других факторов риска | Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений | |
| 188. | Z58.4 | Воздействие радиационного загрязнения | Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений | Лечебный климат |

-
- <1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).
 <2> Функциональный класс (далее - ФК).

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детского населения с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

| N п/п | Код по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Природные лечебные ресурсы |
|--|--------------------|---|---|----------------------------|
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10) | | | | |
| 1. | A15 A17+ A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том | Лечебный климат |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | числе после хирургического лечения | |
| 2. | A16 B90 | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически Последствия туберкулеза | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез | Лечебный климат |
| 3. | R76.1 Z20.1 | Аномальная реакция на туберкулиновую пробу Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом | Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу | Лечебный климат |
| 4. | A18 Y58.0 | Туберкулез других органов Вакцина БЦЖ | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез | Лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10) | | | | |
| 5. | B18 B18.0 B18.1 B18.2 B18.8 | Хронический вирусный гепатит Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента Хронический вирусный гепатит С Другой хронический вирусный гепатит | При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы При отсутствии активности процесса | Лечебный климат Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10) | | | | |
| 6. | E10 | Инсулинзависимый сахарный диабет | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|--|
| | | | ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | |
| 7. | E11 | Инсулиннезависимый сахарный диабет | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 8. | E13 | Другие уточненные формы сахарного диабета | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 9. | E25 E25.0 | Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации | Лечебный климат |
| 10. | E27 E27.1 | Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников | Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации | Лечебный климат |
| 11. | E31 E31.0 | Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная недостаточность | Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации | Лечебный климат |
| 12. | E64 E64.0 E64.1 E64.2 | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково-энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А Последствия | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | E64.3 E64.8 | недостаточности витамина С Последствия рахита Последствия недостаточности других витаминов | Рахитические искривления | |
| 13. | E66 E66.0 E66.1 E66.2 E66.8 | Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией Другие формы ожирения | Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие. Ожирение III и IV степени | Лечебный климат |
| 14. | E84 E84.0 E84.1 E84.8 | Кистозный фиброз Кистозный фиброз с легочными проявлениями Кистозный фиброз с кишечными проявлениями Кистозный фиброз с другими проявлениями | Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени | Лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10) | | | | |
| 15. | F48 F48.8 | Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства | Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 16. | F51 F51.0 F51.1 F51.2 | Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии | Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 17. | F95 F95.0 F95.1 F95.2 | Тики Транзиторные тики Хронические моторные тики или вокализмы Комбинирование вокализмов и | Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | F95.8 | множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта] Другие тики | | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10) | | | | |
| 18. | G09 | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы | Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 19. | G35 | Рассеянный склероз | Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода | Лечебный климат |
| 20. | G43 G43.0 G43.1 G43.3 G43.8 | Мигрень Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень Другая мигрень | Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев. Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев | Лечебный климат |
| 21. | G56 G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 G56.8 | Мононевропатии верхней конечности Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва Другие мононевропатии верхней конечности | Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 22. | G57 G57.0 G57.1 G57.2 G57.3 | Мононевропатии нижней конечности Поражение седалищного нерва Мералгия парестетическая Поражение бедренного нерва Поражение бокового подколенного нерва | Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---|
| | G57.4 | Поражение срединного подколенного нерва | | |
| | G57.5 | Синдром предплюсневого канала | | |
| | G57.6 | Поражение подошвенного нерва | | |
| | G57.8 | Другие мононевралгии нижней конечности | | |
| 23. | G60 | Наследственная и идиопатическая невропатия | Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | G60.0 | Наследственная моторная и сенсорная невропатия | | |
| 24. | G61 | Воспалительная полиневропатия | Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | G61.0 | Синдром Гийена-Барре | | |
| 25. | G71 | Первичные поражения мышц | Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | G71.0 | Мышечная дистрофия | | |
| | G71.2 | Врожденные миопатии | | |
| | G71.3 | Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках | | |
| | G71.8 | Другие первичные поражения мышц | | |
| 26. | G80 | Детский церебральный паралич | Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале системы классификации больших моторных функций (далее - GMFCS), и без грубых интеллектуальных нарушений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | G80.1 | Спастическая диплегия | | |
| | G80.2 | Детская гемиплегия | | |
| | G80.3 | Дискинетический церебральный паралич | | |
| | G80.4 | Атаксический церебральный паралич | | |
| | G80.8 | Другой вид детского церебрального паралича | | |
| 27. | G81 | Гемиплегия | Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | G81.0 | Вялая гемиплегия | | |
| | G81.1 | Спастическая гемиплегия | | |
| 28. | G82 | Параплегия и тетраплегия | Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | G82.0 | Вялая параплегия | | |
| | G82.1 | Спастическая параплегия | | |
| | G82.3 | Вялая тетраплегия | | |
| | G82.4 | Спастическая тетраплегия | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|--|
| 29. | G83 G83.0 G83.1 G83.2 | Другие паралитические синдромы Диплегия верхних конечностей Моноплегия нижней конечности Моноплегия верхней конечности | Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10) | | | | |
| 30. | H01 H01.1 | Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века | Хронические дерматозы вне обострения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 31. | H10 H10.4 H10.5 | Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит | Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения | Лечебный климат |
| 32. | H15 H15.0 H15.1 | Болезни склеры Склерит Эписклерит | Хронический склерит в фазе ремиссии Хронический эписклерит в фазе ремиссии | Лечебный климат |
| 33. | H16 H16.2 | Кератит Кератоконъюнктивит | Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии | Лечебный климат |
| 34. | H20 H20.1 | Иридоциклит Хронический иридоциклит | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии | Лечебный климат |
| 35. | H30 | Хориоретинальное воспаление | Хронический хориоретинит в фазе ремиссии | Лечебный климат |
| 36. | H52 H52.1 | Нарушения рефракции и аккомодации Миопия | Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства) | Лечебный климат |
| 37. | H55 | Нистагм и другие произвольные движения глаз | Оптический нистагм и другие произвольные движения глаз | Лечебный климат |
| 38. | Q15.0 | Врожденная глаукома | Компенсированная форма | Лечебный климат |
| 39. | S05 | Травма глаза и глазницы | Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы) | Лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10) | | | | |
| 40. | H90.3 | Нейросенсорная потеря | Хроническая стадия. | Лечебный климат |

| | | | | |
|---|-------|--|---|-----------------|
| | | слуха двусторонняя | По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота. Хроническая стадия. | |
| | H90.4 | Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе | По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота. Хроническая стадия. | |
| | H90.5 | Нейросенсорная потеря слуха неуточненная | По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота. | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10) | | | | |
| 41. | I01 | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца | Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца | Лечебный климат |
| 42. | I05 | Ревматические болезни митрального клапана | Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса) | Лечебный климат |
| 43. | I06 | Ревматические болезни аортального клапана | | |
| 44. | I07 | Ревматические болезни трехстворчатого клапана | | |
| 45. | I08 | Поражения нескольких клапанов | | |
| 46. | I09.0 | Ревматический миокардит | Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности не выше | Лечебный климат |

| | | | I стадии (ФК I) | |
|-----|----------------------------------|---|---|--|
| 47. | I10 | Эссенциальная (первичная) гипертензия | Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 48. | I11.9 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление. Лабильная артериальная гипертензия, стадия I | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 49. | I30.0 I30.1 I30.8 I30.9 | Острый неспецифический идиопатический перикардит Инфекционный перикардит Другие формы острого перикардита Острый перикардит неуточненный | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Лечебный климат |
| 50. | I33 I33.9 | Острый и подострый эндокардит Острый эндокардит неуточненный | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Лечебный климат |
| 51. | I34 I34.0 I34.8 | Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность Другие неревматические поражения митрального клапана | Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости. Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока. | Лечебный климат |
| 52. | I35 I35.1 I35.8 | Неревматические поражения аортального клапана Аортальная (клапанная) недостаточность Другие поражения аортального клапана | Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока. Недостаточность аортального клапана не выше II степени | Лечебный климат |
| 53. | I40.0 I40.1 I40.8 I40.9 | Инфекционный миокардит Изолированный миокардит Другие виды острого миокардита Острый миокардит неуточненный | Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Лечебный климат |
| 54. | I42.0 | Дилатационная | Кардиомиопатия, ХСН не выше I | Лечебный климат |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|
| | I42.1 | кардиомиопатия Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия | стадии (ФК I) | |
| | I42.2 | Другая гипертрофическая кардиомиопатия | | |
| | I42.5 | Другая рестриктивная кардиомиопатия | | |
| | I42.7 | Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов | | |
| | I42.8 I42.9 | Другие кардиомиопатии Кардиомиопатия неуточненная | | |
| 55. | I44.0 I44.1 | Предсердно-желудочковая блокада первой степени Предсердно-желудочковая блокада второй степени | Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 56. | I45.8 | Другие уточненные нарушения проводимости | Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 57. | I49.1 I49.2 I49.3 I49.4 | Преждевременная деполяризация предсердий Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения Преждевременная деполяризация желудочков Другая и неуточненная преждевременная деполяризация | Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 58. | I95 I95.0 I95.1 | Гипотензия Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия | Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10) | | | | |
| 59. | J12 | Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках | Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Лечебный климат |
| 60. | J13 | Пневмония, вызванная | Бронхопневмония, вызванная | Лечебный климат |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|-----------------|
| | | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | |
| 61. | J14 | Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | Бронхопневмония, вызванная Haemophilus influenzae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Лечебный климат |
| 62. | J15 | Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания). Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Лечебный климат |
| | J15.0 | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae | | |
| | J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком | | |
| | J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы В | | |
| | J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками | | |
| | J15.5 | Пневмония, вызванная Escherichia coli | | |
| | J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями | | |
| | J15.7 | Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae | | |
| | J15.8 | Другие бактериальные пневмонии | | |
| 63. | J17 | Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Лечебный климат |
| | J17.0 | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках | | |
| | J17.2 | Пневмония при микозах | | |
| | J17.3 | Пневмония при паразитарных болезнях | | |
| 64. | J41 | Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит | Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Лечебный климат |
| 65. | J43 | Эмфизема | Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии | Лечебный климат |
| | J43.0 | Синдром Мак-Леода | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|
| | | | дыхательной недостаточности не выше I степени | |
| 66. | J44 J44.8 | Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии | Лечебный климат |
| 67. | J45 | Астма | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Лечебный климат (исключая расположенные во влажной субтропической зоне) |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10) | | | | |
| 68. | K20 | Эзофагит | Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 69. | K21 K21.0 K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые) |
| 70. | K22 K22.0 K22.1 | Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода | Ахалазия кардиальной части пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 71. | K25 | Язва желудка | Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 72. | K26 | Язва двенадцатиперстной кишки | Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 73. | K29 K29.3 K29.8 | Гастрит и дуоденит Хронический поверхностный гастрит Дуоденит | Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 74. | K52 K52.2 | Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 75. | K58 | Синдром раздраженного кишечника | Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии, с | Минеральные воды (питьевые) |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|---|
| | K58.9 | Синдром раздраженного кишечника без диареи | запором легкой и средней степени тяжести | |
| 76. | K59 K59.0 | Другие функциональные кишечные нарушения Запор | Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести | Минеральные воды (питьевые) |
| 77. | K73 K73.0 K73.1 | Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени | Минеральные воды (питьевые) |
| 78. | K74 K74.0 K74.1 K74.3 | Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 79. | K76 K76.0 | Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках | Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 80. | K80 K80.1 K80.2 K80.5 | Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита Камни желчного протока без холангита или холецистита | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 81. | K81 K81.1 | Холецистит Хронический холецистит | Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 82. | K82 K82.8 | Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря | Спайки пузырного протока, желчного пузыря Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| 83. | K86 K86.1 | Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты | Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 84. | K90 K91.2 K91.5 | Нарушения всасывания в кишечнике Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Постхолестестэктомиический синдром | Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии | Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10) | | | | |
| 85. | L40 L40.0 L40.1 L40.2 L40.3 L40.4 L40.8 | Псориаз Псориаз обыкновенный Генерализованный пустулезный псориаз Акродерматит стойкий [Аллопо] Пустулез ладонный и подошвенный Псориаз каплевидный Другой псориаз | Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы |
| 86. | L63 L63.0 L63.1 L63.2 L63.8 | Гнездная алопеция Алопеция тотальная Алопеция универсальная Гнездная плешивость (лентовидная форма) Другая гнездная алопеция | Алопеция, фаза ремиссии | Лечебный климат |
| 87. | L85 L85.0 L85.1 L85.2 L85.3 L85.8 | Другие эпидермальные утолщения Приобретенный ихтиоз Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный Кератоз точечный (ладонный-подошвенный) Ксероз кожи Другие уточненные эпидермальные утолщения | Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 88. | L91 L91.0 L91.8 | Гипертрофические изменения кожи Келоидный рубец Другие гипертрофические изменения кожи | Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 89. | L94 L94.0 | Другие локализованные изменения соединительной ткани Локализованная склеродермия [morphea] | Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | L94.1 L94.8 | Линейная склеродермия Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани | | |
| Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10) | | | | |
| 90. | B91 | Последствия полиомиелита | Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием негрубых вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 91. | M02 M02.2 M02.3 M02.8 | Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии | Реактивные артропатии, неактивная фаза инфекционного процесса | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 92. | M07 M07.0 M07.1 M07.2 M07.3 | Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Мутилирующий артрит Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии | Артропатии, артрит: дистальный межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 93. | M08 M08.0 M08.1 M08.2 M08.3 M08.4 M08.8 | Юношеский (ювенильный) артрит Юношеский ревматоидный артрит Юношеский анкилозирующий спондилит Юношеский артрит с системным началом Юношеский полиартрит (серонегативный) Пауциартикулярный юношеский артрит Другие юношеские артриты | Без висцеритов, активность заболевания не выше I степени, при условии самостоятельного самообслуживания и передвижения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 94. | M33 M33.0 | Дерматополимиозит Юношеский дерматомиозит | Фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 95. | M36 | Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в | Фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| | M36.2 | других рубриках Артропатия при гемофилии | | |
| 96. | M40 M40.0 M40.1 M40.2 M40.3 M40.4 | Кифоз и лордоз Кифоз позиционный Другие вторичные кифозы Другие и неуточненные кифозы Синдром прямой спины Другие лордозы | Кифозы, лордозы I, II степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 97. | M41 M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.5 M41.8 | Сколиоз Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза | Сколиозы I, II, III степени | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 98. | M42 M42.0 | Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника | Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 99. | M91 M91.0 M91.1 M91.3 M91.8 | Юношеский остеохондроз бедра и таза Юношеский остеохондроз таза Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса] Псевдококсалгия Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза | Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза, фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 100. | M92 M92.0 M92.1 M92.2 M92.3 M92.4 | Другие юношеские остеохондрозы Юношеский остеохондроз плечевой кости Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости Юношеский остеохондроз кисти Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей Юношеский остеохондроз | Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|---|-------|---|--|--|
| | M92.5 | надколенника Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей | | |
| | M92.6 | Юношеский остеохондроз предплюсны | | |
| | M92.7 | Юношеский остеохондроз плюсны | | |
| | M92.8 | Другой уточненный юношеский остеохондроз | | |
| Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10) | | | | |
| 101. | N03 | Хронический нефритический синдром | Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже) | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 102. | N04 | Нефротический синдром | Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 103. | N07 | Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках | Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 104. | N11 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| | N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом | | |
| | N11.1 | Хронический обструктивный пиелонефрит | | |
| | N11.8 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | | |
| 105. | N13 | Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия | Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс | Лечебный климат |
| | N13.0 | Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения | 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): | |
| | N13.1 | Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках | неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при | |
| | N13.2 | Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем | несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного | |
| | N13.4 | Гидроуретер | процесса, без нарушений | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | N13.5 N13.7 N13.8 | Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза Уропатия, обусловленная пузырно- мочеточниковым рефлюксом Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия | уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | |
| 106. | N 15 | Другие тубулоинтерстициальные болезни почек | Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные) | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 107. | N18 N18.8 | Хроническая почечная недостаточность Другие проявления хронической почечной недостаточности | Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации | Лечебный климат |
| 108. | N20 N20.0 N20.1 N20.2 | Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника | Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат |
| 109. | N30 N30.1 N30.2 N30.3 | Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит | Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии | Лечебный климат |
| 110. | N31 N31.0 N31.1 N31.2 N31.8 | Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря | Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи | Лечебный климат |
| 111. | N70 | Сальпингит и оофорит | Хроническая стадия, фаза ремиссии | Минеральные воды (для |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит | | наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 112. | N71 N71.1 | Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки | Хронический эндометрит, фаза ремиссии | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат |
| 113. | N76 N76.1 | Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Подострый и хронический вагинит | Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии | Лечебный климат, лечебные грязи |
| 114. | N91 N91.0 N91.1 N91.3 N91.4 | Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации Первичная аменорея Вторичная аменорея Первичная олигоменорея Вторичная олигоменорея | Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии. Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями. Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках. Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи |
| 115. | N94 N94.0 N 94.3 | Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом Боли в середине менструального цикла Синдром предменструального напряжения | Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза. Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени. | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи |

| | | | | |
|--|-------|---|---|--|
| | N94.4 | Первичная дисменорея | Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза. | |
| | N94.5 | Вторичная дисменорея | Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза | |
| 116. | N99 | Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза | Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи |
| | N99.4 | Послеоперационные спайки в малом тазу | | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10) | | | | |
| 117. | Q21 | Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии | Лечебный климат |
| | Q21.0 | Дефект межжелудочковой перегородки | | |
| | Q21.1 | Дефект предсердной перегородки | | |
| | Q21.2 | Дефект предсердно-желудочковой перегородки | | |
| | Q21.3 | Тетрада Фалло | | |
| | Q21.4 | Дефект перегородки между аортой и легочной артерией | | |
| | Q21.8 | Другие врожденные аномалии сердечной перегородки | | |
| 118. | Q22 | Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов | Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии | Лечебный климат |
| | Q22.2 | Врожденная недостаточность клапана легочной артерии | | |
| | Q22.3 | Другие врожденные пороки клапана легочной артерии | | |
| | Q22.5 | Аномалия Эбштейна | | |
| | Q22.6 | Синдром правосторонней гипоплазии сердца | | |

| | | | | |
|------|-------|--|---|-----------------|
| | Q22.8 | Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана | | |
| 119. | Q23 | Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов | Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии | Лечебный климат |
| | Q23.1 | Врожденная недостаточность аортального клапана | | |
| | Q23.3 | Врожденная митральная недостаточность | | |
| | Q23.4 | Синдром левосторонней гипоплазии сердца | | |
| | Q23.8 | Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов | | |
| 120. | Q24 | Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца | Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии | Лечебный климат |
| | Q24.0 | Декстрокардия | | |
| | Q24.1 | Левокардия | | |
| | Q24.2 | Трехпредсердное сердце | | |
| | Q24.4 | Врожденный субаортальный стеноз | | |
| | Q24.5 | Аномалия развития коронарных сосудов | | |
| | Q24.8 | Другие уточненные врожденные аномалии сердца | | |
| 121. | Q32 | Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов | Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени; дыхательная недостаточность не выше I степени | Лечебный климат |
| | Q32.0 | Врожденная трахеомалация | | |
| | Q32.1 | Другие пороки развития трахеи | | |
| | Q32.2 | Врожденная бронхомалация | | |
| | Q32.3 | Врожденный стеноз бронхов | | |
| | Q32.4 | Другие врожденные аномалии бронхов | | |

| | | | | |
|------|-------|--|--|-----------------------------|
| 122. | Q33 | Врожденные аномалии [пороки развития] легкого | Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени | Лечебный климат |
| | Q33.0 | Врожденная киста легкого | | |
| | Q33.1 | Добавочная доля легкого | | |
| | Q33.2 | Секвестрация легкого | | |
| | Q33.3 | Агенезия легкого | | |
| | Q33.4 | Врожденный бронхоэктаз | | |
| | Q33.5 | Эктопия ткани в легком | | |
| | Q33.6 | Гипоплазия и дисплазия легкого | | |
| | Q33.8 | Другие врожденные аномалии легкого | | |
| 123. | Q63 | Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки | Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Минеральные воды (питьевые) |
| | Q63.0 | Добавочная почка | | |
| | Q63.1 | Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка | | |
| | Q63.2 | Эктопическая почка | | |
| | Q63.3 | Гиперпластическая и гигантская почка | | |
| | Q63.8 | Другие уточненные врожденные аномалии почки | | |
| 124. | Q64 | Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы | Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Лечебный климат |
| | Q64.0 | Эписпадия | | |
| | Q64.1 | Экстрофия мочевого пузыря | | |
| | Q64.2 | Врожденные задние уретральные клапаны | | |
| | Q64.3 | Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря | | |
| | Q64.4 | Аномалия мочевого протока [урахуса] | | |
| | Q64.5 | Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала | | |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| | Q64.7 | Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала | | |
| 125. | Q65 Q65.0 Q65.1 Q65.3 Q65.4 Q65.6 Q65.8 | Врожденные деформации бедра Врожденный вывих бедра односторонний Врожденный вывих бедра двусторонний Врожденный подвывих бедра односторонний Врожденный подвывих бедра двусторонний Неустойчивое бедро Другие врожденные деформации бедра | Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 126. | Q66 Q66.0 Q66.1 Q66.2 Q66.3 Q66.4 Q66.5 Q66.6 Q66.7 Q66.8 | Врожденные деформации стопы Конско-варусная косолапость Пяточно-варусная косолапость Варусная стопа Другие врожденные варусные деформации стопы Пяточно-вальгусная косолапость Врожденная плоская стопа [pes planus] Другие врожденные вальгусные деформации стопы Полая стопа [pes cavus] Другие врожденные деформации стопы | Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 127. | Q67 Q67.5 | Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки Врожденные деформации позвоночника | Врожденный сколиоз | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения) |
| 128. | Q77 Q77.7 | Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника Спондилоэпифизарная | Спондилоэпифизарная дисплазия | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные |

| | | | | |
|---|-------|--|---|--|
| | | дисплазия | | грязи |
| 129. | Q79 | Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках | Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | Q79.6 | Синдром Элерса-Данло | | |
| Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10) | | | | |
| 130. | S06 | Внутричерепная травма | Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и дизэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств | Лечебный климат |
| 131. | S14 | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи | Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы | Лечебный климат Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 132. | S24 | Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе | Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не | Лечебный климат |

| | | | | |
|------|-------|---|--|---|
| | | | <p>требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p> |
| 133. | S34 | <p>Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза</p> | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Лечебный климат</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p> |
| 134. | T88.8 | <p>Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках</p> | <p>Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести,</p> | <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p> |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| | | | без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | |
| 135. | T91 T91.1 | Последствия травм шеи и туловища Последствия перелома позвоночника | Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 136. | T92 T92.0 T92.1 T92.2 T92.3 T92.4 T92.5 T92.6 T92.8 | Последствия травм верхних конечностей Последствие открытого ранения верхней конечности Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть Последствие перелома на уровне запястья и кисти Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности Последствие травмы нерва верхней конечности Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности Последствие других уточненных травм верхней конечности | Артриты и артрозы травматического происхождения. Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| 137. | T93 T93.0 T93.1 T93.2 T93.3 T93.4 T93.5 | Последствия травм нижней конечности Последствие открытого ранения нижней конечности Последствие перелома бедра Последствие других переломов нижней конечности Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности Последствие травмы нерва нижней конечности Последствие травмы мышцы и сухожилия | Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |

| | | | | |
|------|-------|--|---|---|
| | T93.6 | нижней конечности Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности | | |
| | T93.8 | Последствие других уточненных травм нижней конечности | | |
| 138. | T95 | Последствия термических и химических ожогов и обморожений | Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. | Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи |
| | T95.0 | Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи | Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений. | |
| | T95.1 | Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища | Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. | |
| | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с | |
| | T95.3 | Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности | восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран | |
| | T95.4 | Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела | | |
| | T95.8 | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений | | |
| | T95.9 | Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений | | |

III. Медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 21 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.
5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
6. Заразные болезни глаз и кожи.
7. Паразитарные заболевания.
8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <3>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".

9. Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения при наличии бактериовыделения, подтвержденного бактериоскопическим, бактериологическим или молекулярно-генетическим методами;
10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
12. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
13. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
16. Кахексия любого происхождения.
17. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

18. Заболевания и состояния, определенные по результатам научных исследований природных лечебных ресурсов, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.